

CUM NE PREGĂTIM PENTRU BRONHOSCOPIE?

- Ultima masă va fi în seara dinaintea bronhoscopiei
- Fumatul este contraindicat cu 2 ore înaintea manevrei
- Nu se consumă cafea în ziua bronhoscopiei, influențează calitatea anesteziei
- Este de preferat să nu conduceți automobilul propriu când veniți la spital pentru efectuarea bronhoscopiei
- Pacienții diabetici NU vor lua antidiabeticele orale și nici insulina în dimineața procedurii; se măsoară glicemia și numai dacă aceasta depășește 200 mg% se poate administra insulină, dar în doză mai mică decât prevede schema personală, pentru a evita pericolul hipoglicemiei. Măsurarea glicemiei și administrarea insulinei se va face după ce pacientul ajunge la spital, în cazul pacienților ambulatori.
- Pacienții cardio-vasculari își vor lua medicamentele **antiaritmice** și **antihipertensive** din schema personală **nemodificat** în dimineața procedurii
- Anticoagulatele orale (ex: Eliquis, Xarelto, Pradaxa) se întrerup cu min 48h preprocedural și se înlocuiesc cu HGMM (heparine cu greutate moleculară mică); acestea din urmă se administrează în seara dinaintea intervenției dar nu și în dimineața intervenției, administrarea putând fi reluată la min 6h post-procedural (se va reveni la anticoagulantul oral în ziua următoare)
- Aspirina NU se întrerupe decât ce mult în ziua intervenției
- Anticoagulatele orale de tip cumarinic (acenocumarol, trombostop, sintrom) se intrerup cu minim 5 zile preoperator si trebuie inlocuite cu HGMM in doza terapeutica; cu acestea din urmă se procedează după modelul descris anterior
- Antiagregantele plachetare de generatie noua (Plavix, Trombex, Ticlid, Prasugrel, Cangrelor, Aflen etc) trebuie oprite cu 5 zile preprocedural si inlocuite cu aspirina po. Pot fi reluate în ziua următoare intervenției.

- În cazul tratamentelor cronice cu cortizon, acestea nu vor fi întrerupte nici în ziua intervenției
- Restul medicațiilor cronice nu necesită precizări suplimentare, dar este de preferat să se întrerupă în dimineața intervenției pentru a nu crește în mod inutil cantitatea de apă ingerată.
- După bronhoscopie se contraindică ingerarea de apă sau alimente timp de 2 ore
- Unele persoane pot avea la câteva ore după bronhoscopie un puseu febril care se remite cu antitermice
- După ce a primit sedare iv pacientul nu are voie să conducă autovehicule timp de 24-48 h și este recomandat să rămână sub supraveghere minim 6 h; de asemenea, se recomandă să nu părăsească domiciliul nesupravegheat în primele 24h.

